Внимание!
Если вы держите домашнюю или декоративную птицу!

Мы информируем вас о вспышке птичьего гриппа в трёх регионах России (Пензенской, Курской, Самарской областях).

Во избежание заноса вируса в хозяйство, владельцам птицы необходимо обеспечить следующее:

- поение птиц осуществлять, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается дикая птица;

- содержать птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (без выгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.д.)**;**

- приобретать птицу и инкубационные яйца, только из благополучных хозяйств, подтверждённых ветеринарным сопроводительным документом;

- не приобретать птицу в несанкционированных местах торговли;

- кормление птиц желательно проводить в помещении, чтобы не привлекать других птиц;

- проводить своевременную уборку помещений, дворовых территорий, загонов и клеток ;

- изолированно хранить инвентарь по уходу за птицей и содержать его в чистоте;

- после очистки помещений проводить дезинфекцию инвентаря и птичников;

- использовать пух и перо для бытовых целей после тепловой обработки;

- утилизацию помета желательно проводить путем сжигания или биотермическим методом.

Владельцы птицы обязаны соблюдать «Ветеринарные правила содержания птицы на личных подворьях граждан и птицеводческих предприятиях открытого типа», утвержденных Приказом Минселхоза РФ от 03.04.2006 г.

Помните! Вспышки птичьего гриппа обусловлены сезонностью (тёплое время года).

Гриппом болеют все виды домашних, синантропных и диких птиц. Болезнь заносится на новую территорию, как правило, с дикими перелетными, чаще водоплавающими птицами.

Основные пути передачи возбудителя болезни - передача через корм или воду, а также при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей - воздушно капельным путём, поражая респираторные органы и желудочно-кишечный тракт, а также через зараженные вирусом птицеводческую продукцию (мясо, яйцо, перо, пух), птичий помет, корма, воду, предметы ухода. При гриппе птиц происходит массовая гибель птицы.

Вторичная передача между и внутри коммерческих птицефабрик обычно происходит путем механической передачи через зараженные вирусом материалы или при перемещении инфицированных птиц. Важными источниками инфекции являются: люди, автомобили, оборудование, одежда и обувь. К факторам высокого риска передачи между птицефабриками также относятся: бригады и оборудование, задействованные в вакцинации, обработке помёта, транспортировке молодок и кур в конце яйцекладки.

При появлении симптомов или в случаях внезапного массового падежа птицы, для выявления причин заболевания птицы и недопущения дальнейшего распространения, необходимо немедленно обратиться в ближайшее учреждение государственное ветеринарной службы!